

Priporočila za obravnavo razseljenih oseb glede tuberkuloze (TB)

Pri obravnavi razseljenih oseb iz Ukrajine se upoštevajo priporočila ECDC in nacionalna priporočila obravnave tuberkuloze.

Priporočila:

Aktivna tuberkulozna okužba

- Splošno testiranje na aktivno TB pri razseljenih odraslih in otrocih iz Ukrajine ni priporočeno.
- Nacionalni program za TB priporoča uporabo vprašalnikov in ukrepanja po navodilih glede na izpolnjen vprašalnik. ([za odrasle](#), [za otroke](#))
- Testiranje na aktivno TB je potrebno pri osebah iz ranljivih skupin prebivalstva (enako kot je veljalo do sedaj).

Latentna tuberkulozna okužba (LTBO)

- Splošno testiranje na LTBO pri razseljenih odraslih in otrocih iz Ukrajine ni priporočeno.
- Testiranje na LTBO in preventivno zdravljenje je potrebno pri osebah iz ranljivih skupinah prebivalstva, enako kot je veljalo do sedaj, na primer, osebe okužene s HIV, osebe, ki so bile v stiku z bolnikom s TB pljuč, osebe pred predvideno transplantacijo solidnih organov ali krvotvornih celic, osebe pred predvidenim zdravljenjem z določenimi biološkimi zdravili, pri skupinah oseb, kjer se je pojavila mikroepidemija in druge.

Petra Svetina, dr. med., spec.

Vodja Registra tuberkuloze RS